

Drosétux®

SIROP

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **DROSETUX®**, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **DROSETUX®**, sirop ?
- 3- Comment prendre **DROSETUX®**, sirop ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **DROSETUX®**, sirop ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DROSETUX®, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux sèche, d'irritation et dans les toux non productives gênantes.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DROSETUX®, sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DROSETUX®, sirop :

- Si vous présentez une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares), en raison de la présence de saccharose.

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de toux productives (toux grasses) qui doivent être respectées car nécessaires à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

EN CAS DE DOUTE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DROSETUX®, sirop :

- Ce médicament contient :
 - 2,1 g de saccharose par dose de 2,5 ml
 - 4,2 g de saccharose par dose de 5 ml
 - 12,6 g de saccharose par dose de 15 mldont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

- Consultez votre médecin ou votre pharmacien :
 - Si votre toux persiste plus de 5 jours.
 - Si vous êtes atteint d'une maladie chronique des bronches ou des poumons.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DROSETUX®, sirop

Excipient à effet notoire : saccharose.

3- COMMENT PRENDRE DROSETUX®, sirop ?

Posologie et mode d'administration

Utiliser le godet-doseur à la graduation indiquée ci-dessous.

Adultes : 1 dose de 15 ml 2 à 3 fois par jour.

Enfants : - à partir de 5 ans : 1 dose de 5 ml 3 à 5 fois par jour.
- moins de 5 ans : 1 dose de 2,5 ml 3 à 4 fois par jour.

Voie d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas, et au coucher.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **DROSETUX®, sirop** est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance

Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5- COMMENT CONSERVER DROSETUX®, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser **DROSETUX®, sirop** après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient **DROSETUX®, sirop** ?

Les substances actives sont :

| | |
|----------------------------|------|
| Drosera | 3 CH |
| Arnica montana | 3 CH |
| Belladonna | 3 CH |
| Cina | 3 CH |
| Coccus cacti | 3 CH |
| Corallium rubrum | 3 CH |
| Cuprum | 3 CH |
| Ferrum phosphoricum | 3 CH |
| Ipeca | 3 CH |
| Solidago virga aurea | 1 CH |

aa

Les autres composants sont : Sirop simple, benzoate de sodium, acide citrique et eau purifiée.

Qu'est ce que **DROSETUX®, sirop** et contenu de l'emballage extérieur ?

DROSETUX® se présente sous forme de sirop. Il est conditionné dans une boîte contenant un flacon de 150 ml avec un godet-doseur gradué.

Titulaire, exploitant et fabricant : **BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France



BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.